
Milben – leben Sie ihr Feindbild aus!



Zu finden: http://www.saarlandimker.de unter Bienengesundheit

meus07 07 14 Seite 1 von 3

Varroa wird dezimiert:

1 – Drohnenrähmchen März-Juli (hilft auch für Schwarmkontrolle, generelle Volksgesundheit, Vitalitätsbegutachtung)

2 – Zugelassene Varroazidanwendungen

A – Verteilt durch den Imker (Milchsäuresprühung im brutfreien Zustand oder zweimalig in Abstand 7 bis 10 Tage)

B – Verteilt durch die Bienen (Oxalsäureträufelung, Bayvarol, Perizin)

C – Verteilt durch Verdunstung (Ameisensäure und Thymol – "Varroawetter". Zugelassen sind die gängigen Langzeitverdunster Nassenheider und Liebig, bzw. baugleiche mit 60%iger Ameisensäure (AS). 85%ige AS ist verschreibungspflichtig. Schwammtuchmethode ist **nicht** offiziell zugelassen)

Achtung, einige Behandlungen sind in das Medikamentebuch derBienenvölker einzutragen! – siehe Broschüre

Varroabehandlung: Viele Möglichkeiten veterinäramtlich zugelassen

Varroazid/Bezug	Besonderer Wirkstoff	Anwendung	Urteil
Ameisensäure 60% ad us. vet. Handel		Verdunstung in Völkern mit Brut	Sehr gute Wirkerfolge bei korrekter Anwendung rückstandsfrei, bienenakzeptabel
Apiguard Thymovar Api Life Var Apotheke	Thymol	Verdunstung in Völkern mit Brut	relativ gute Wirkung bienenakzeptabel, Futteraufnahme reduziert Behandlungsbeginn Anfang Juli wichtig
Milchsäure 15% ad us. vet. Handel		Sprühverfahren in Völkern ohne Brut Weniger Bienenfall als bei Perizin!!!	Sehr gute Wirkerfolge bei korrekter Anwendung rückstandsfrei, bienenakzeptabel
Oxuvar Apotheke	3,5% Oxalsäure- dihydrat in Zuckerlösng.	Träufelmethode in Völkern ohne Brut Nov./Dez.	Sehr gute Wirkerfolge bei korrekter Anwendung rückstandsfrei, bienenakzeptabel

Bayvarol Apotheke	Flumethrin (Pyrethroid - Insektizid)	Streifen, die von den Bienen belaufen werden	Resistenzbildung bei Milben
Perizin Apotheke	Coumaphos	Träufelung	Rückstandsbildung im Wachs, die kumulativ für die Bienen kritisch werden kann und Rückstände im Honig verursachen kann

Coumaphos ist ein Insektizid das zur Kontrolle einer Vielzahl von Insekten bei der Tierproduktion, darunter Maden, Schneckenwürmer, Läuse, Krätzmilben, Fliegen und Zecken eingesetzt wird; In der Schweiz und in Deutschland sind keine Pflanzenschutzmittel zugelassen, die Coumaphos als Wirkstoff enthalten.

Effektiv

Thymol hat seine
Behandlungsnachteile
und ist für Waldvölker
inpraktikabel!
Thymovar Hinweise
der Uni Hohenheim
sind unbedingt
zu beachten!

└ Mit großem └ Caveat

Coumaphos hemmt
Cholinesterase,
schädigt Reizleitung/
Muskelfunktion;
Flumethrin - Natriumkanäle der Zellen,
auch der Nervenzellen!
Spastische Lähmung
und Tod!

